

**Avagy a csincsillákkal kapcsolatos GYakran Ismételt Kérdések.**

Ha a kérdésre kattintasz, megkapod a választ, majd a válaszra kattintva visszakerülsz a kérdések közé :)

1. [Mi az a Csincsilla?](#)
2. [Vannak különböző csincsilla fajták?](#)
3. [Honnan származik a csincsilla?](#)
4. [Mennyi ideig él egy csincsilla?](#)
5. [Vannak különböző színek?](#)
6. [Mit eszik-iszik a csincsilla?](#)
7. [Mit adhatok neki nasit, és mennyit?](#)
8. [Mi a megfelelő súly egy átlagos állatnál?](#)
9. [Fiú vagy lány csincsillát válasszak?](#)
10. [Honnan tudom fiú-e vagy lány?](#)
11. [Mi a jó csincsilla név?](#)
12. [Hogyan fogjam meg a csincsillámat?](#)
13. [Milyen ketrec a legmegfelelőbb neki?](#)
14. [Hova tegyem a ketrecet?](#)
15. [Utazhatok a csincsillámmal?](#)
16. [Honnan tudom, hogy egészséges?](#)
17. [Mik azok, amire figyelnem kell, az egészsége érdekében?](#)
18. [Betaníthatom a csincsillámat trükkökre?](#)

19. [Tarthatok egynél több csincsillát egy ketrecben?](#)
20. [Szabad ?rokon? csineket pároztatni?](#)
21. [Azonos színű csincsillákat pároztathatok?](#)
22. [Mikor szabad pároztatni a csincsilláimat?](#)
23. [Mennyi idő, míg a csincsilla bábik megszületnek?](#)
24. [Ha megszülettek a kicsik, az apuka velük maradhat?](#)
25. [Kell szünet két szülés között?](#)
26. [Milyen legyen a terhes anyuka gondozása, és utógondozása?](#)
27. [Mikor választhatom el a bébi csincsillát?](#)
28. [Tarthatom a csincsillámat más fajta állatokkal?](#)
29. [Harapnak?](#)
30. [Van szaguk?](#)
31. [Zajosak?](#)
32. [Okos állat a csincsilla?](#)
33. [Hagyhatom a csincsillámat kutyámmal vagy macskámmal játszani?](#)
34. [Szabadon engedhetem a házban?](#)
35. [Szeretnek játékokkal játszani?](#)
36. [Milyen anyagok biztonságosak?](#)
37. [Miért szalad el a csincsillám, amikor meg akarom fogni?](#)
38. [Hogyan hűtsem nyáron a csincsillát?](#)
39. [Honnan ismerem fel, ha hőgutát kapott, és mit tegyek ellene?](#)
40. [Mit tegyek, ha hasmenése van?](#)
41. [Mit tegyek, ha váladékozik a szeme?](#)

42. [Mennyi idő alatt és hogyan szoktathatok össze két csincsillát?](#)
43. [Miért, mikor és milyen hangokat ad ki?](#)
44. [Hullik a csinem szőre, mit tegyek, mi az oka?](#)
45. [Honnan tudom, hogy vemhes a nőtényem?](#)

### [Mi az a Csincsilla?](#)

A csincsilla egy imádnivaló rágcsáló, akinek szinte semmi köze sincsen a nyúlhoz :)

Éjszakai állat, növényekkel táplálkozik.

Sajnos sokáig kizárólag gyönyörű bundájáért tenyésztették, manapság azonban egyre elterjedtebb házikedvenc. Bővebben az [Amerikából jöttem](#) menüpontban.

### [Vannak különböző csincsilla fajták?](#)

2 faja ismert:

Chinchilla lanigera - ez az általunk tartott kiskedvenc

Chinchilla brevicaudata, ezt nem szokás háziállatként tartani (volt még pár egyéb Chinchilla faj is, de azok kipusztultak)

A brevicaudatának kisebb és szőrös (!) fülei vannak, az egész állat viszont nagyobb, mint a lanigera.

A két fajt lehet keresztezni, mint pl. a lovat meg a szamarat - az eredmény is ugyanaz: tovább nem szaporítható egyedek.

A Chinchilla lanigerának két alfaja, inkább típusa ismert a tenyésztésben:

A La Plata és a Costina. Előbbi Dél-Amerika belsejében élt, és "kerekebb" (pisze orrú csinikJ) az utóbbi a part mentén, és karcsúbb az állat (hegyes orrú).

Bővebben a [Biológia óra](#) menüpontban.

### [Honnan származik a csincsilla?](#)

Dél-Amerikából, az Andokból származik. Csapatokba verődve, a hegyekben bujkálva élték éjszakai életüket. Nevüket a CHINCHA indiánokról kapták, akik vadásztak rájuk, húsukat megették, bundájukat pedig ruhaként használták.

1918-ban egy bányamérnök, Mathias F. Chapman, megvásárolt egy befogott példányt, és ezzel útjának indult a csincsillatenyésztés.

Bővebben az [Amerikából jöttem](#) menüpontban.

### [Mennyi ideig él egy csincsilla?](#)

A csincsilla helyes tartás mellett 15, extrém esetben 20 évig is élélhet.

### [Vannak különböző színek?](#)

A szürke (standard) csincsillák szőre, mint a ?vadas? állatoknak általában, a hátukon ?3 színű?, a hasukon pedig hófehér. A háton pehelyszőrök a következőképpen néznek ki: a bőrhöz közel található az alsó zóna, ez szürke. A következő a szalag, ez fehér, majd a fátyol, ez megint szürke, de néha olyan sötét, hogy feketének tűnik. Ezen kívül van még ú.n.

koronaszőrök, ez picit hosszabb, és keményebb, mint a pehelyszőr.

A pár évtizedes tenyésztés alatt kialakultak azonban különböző színváltozatok, ezek között akad, amelyeknek nem fehér a hasa, és/vagy nem 3színű a szőre.

Bővebben a [Biológia óra](#) menüpontban.

### [Mit eszik-iszik a csincsilla?](#)

Mindig legyen a csininél friss ivóvíz!

Mindig kell: széna és megfelelő, speciális csincsilla táp! (Nem nyúl, vagy rágcsáló eledel!)

Változatos étrend, amihez nálunk a legjobban bevált, ha három etetőtáblából kettőben van táp, a harmadikban a vegyes nasi.

Bővebben a [Gasztronómia](#) menüpontban.

### [Mit adhatok neki nasit, és mennyit?](#)

Elvileg(!) szeretik a szárított répát, almát., banán csipszet. Szárított - vegyszermentes-rózsabimbó, és bármilyen szárított zöldséget, gyümölcsöt. A mazsola szinte mindig beválik, mint kényeztetés. Egy nagyon fontos dolog:

Frissen maximum napi 1/8-ad alma/csincsilla!

Bővebben a [Gasztronómia](#) menüpontban.

### [Mi a megfelelő súly egy átlagos állatnál?](#)

Felnőtt csincsillák 400 grammtól felfele bármekkorák lehetnek szinte :) Egy 3 hónapos állat nem szabad, hogy kevesebb legyen 200 grammnál! Az újszülöttek pedig 35-60 gramm között vannak.

### [Fiú vagy lány csincsillát válasszak?](#)

Minden csincsilla külön egyéniség, így nem lehet behatározni, hogy a lányok nyűgösebbek, vagy a fiúkat könnyebb kézhez szoktatni. Mi gyakran tapasztaljuk, hogy a fiúk azért nyugisabb, lassabb típusok :)

Bővebben az [Egyedül nem megy](#) menüpontban.

### [Honnan tudom fiú-e vagy lány?](#)

Tapasztalatlan szemnek elsőre nehézkes lehet a nem megállapítása, de ha egyszer közelről láttál csincsilát alulnézetből, valószínűleg többé nem kevered össze őket:)

Miért nehéz megkülönböztetni? A nőtényeknek is van egy, álhímveszőnek nevezett szarucsapjuk, ami közvetlenül a végbélnyílás előtt helyezkedik el.

A hímek hímveszője a végbélnyílástól legalább 1 cm-re van a kifejlett egyedeknél. Ez pedig határozottan megtévesztő lehet!

Bővebben a [Biológia óra](#) menüpontban.

### [Mi a jó csincsilla név?](#)

Erre lehetetlen tippet adni. Egy biztos, a legtalálhatóbb nevek a tulajdonságok alapján születnek:)

### [Hogyan fogjam meg a csincsilámat?](#)

A csincsilát két kézzel fogd meg, főleg ha felnőtt állat.

Egyik kezeddal nyúlj a hasa alá, másikkal pedig stabilan markold meg a farkincája tövét. Vigyázz, tényleg a tövét fog, úgy nem törheted el. Másik kezeddal pedig igyekezz megtámasztani a lábait!

### [Milyen ketrec a legmegfelelőbb neki?](#)

Min. 60\*40\*80 cm - minél magasabb, annál jobb! Tilosak a létrák, és a rácspolc! Inkább használj tömör fa, vagy nagyon sűrű (6\*6 mm) rácsos polcot.

Bővebben a [Fészekrakó](#) menüpontban.

### [Hova tegyem a ketrecet?](#)

A csincsilla két dologra igazán érzékeny, a hőmérsékletre és a huzatra!

Szabályok a ketrec elhelyezéséhez:

- NE kerüljön fűtőtest közvetlen közelébe
- NE tegyük közvetlen napfényre
- NE legyen huzatos helyen
- Az ideális hőmérséklet 15-20 fok
- Olyan helyen legyen, ahol gyakran lát téged ? de ő is tudjon napközben aludni!
- Zajos (rág, ugrabugrál stb.) ? tudj tőle aludni

Bővebben a [Fészekrakó](#) menüpontban.

### [Utazhatok a csincsillámmal?](#)

Természetesen megfelelő körülmények között utazhatsz vele.

A csincsilláknak az utazás hatalmas stressz és egészségi veszélyforrás.

Tele van a kinti környezet olyan bacilusokkal, veszélyekkel, amik ellen nem biztos, hogy képes védekezni a szervezetük.

Ha 1-2-3 napra utazol el, hagyj neki(k) dupla itatót, dupla adag szenat tapot, es hagyd őket otthon, kibirják.

Persze legjobb, ha meg tudod oldani, jobb ha családot, barátot kérsz meg a gondoskodásra, hosszú távon mindenképpen!

Ha mindenképpen magaddal szeretnéd vinni, egy macskahordozó szükséges, illetve az, hogy útközben is biztosítani tudd neki a megfelelő hőmérsékletet, ételt ?italt.

IC-re állatot felvinni tilos, személy és gyors vonatra hordozónként (szállítási egységként) állatjegyet kell vásárolnod.

Külföldre pedig különböző papírok szükségesek, ezeknek érdemes utána járni!

### [Honnan tudom, hogy egészséges?](#)

Élénken reagál mindenre, fényes, nem váladékos a szeme, bundája sűrű, nem tapad össze, és a ?végtermékei? sötétek, hosszúkásak, és nem ragacsosak.

Bővebben az [Egészségére](#) menüpontban.

### [Mik azok, amire figyelnem kell, az egészsége érdekében?](#)

A csincsilla két dologra igazán érzékeny, a hőmérsékletre és a huzatra! Ne tedd ki huzatnak, ne érje közvetlenül tűző nap, illetve az ideális hőmérséklet számára 15-20 celsius.

Speciális csincsilla tápot, szenát és friss vizet kapjon rendszeresen, emellett gyógynövényeket, zöldségeket is kaphat de csak mértékkel. A sok lédús táplálék hasmenést okozhat!

Bővebben az [Egészségére](#) menüpontban.

### [Betaníthatom a csincsillámat trükkökre?](#)

A csincsilla az egyik legokosabb rágcsáló, trükkök betanítására azonban nem alkalmas.

Nagyon önfejű, csak akkor reagál, ha ő is akarja :)

### [Tarthatok egynél több csincsillát egy ketrecben?](#)

Sőt! Kötelezően ajánlott :) A csincsilla társas lény, de sajnos akármilyen jó gazdi, az ember mégsem megfelelő társ a csin számára. Akár azonos nemű csincsillákat is tarthatsz együtt kellő összeszoktatás után.

Bővebben az [Egyedül nem megy](#) menüpontban.

### [Szabad ?rokon? csineket pároztatni?](#)

Kifejezetten tilos! Beltenyésztés a csincsiláknál is veszélyes a mamára és az utódokra nézve is!

### [Azonos színű csincsilákat pároztathatok?](#)

Két standard, azaz szürke csincsilát minden további nélkül, de bizonyos színmutációkat, pl black-velvetet másik black-velvettel tilos!

### [Mikor szabad pároztatni a csincsiláimat?](#)

A csinik 4-6 hónapos korukban válnak ivaréretté, és a lány csinik 28-35 naponta tüzelnek. Nagyon figyelni kell arra, hogy a lány csini minimum 8-9 hónapos legyen, amikor ivarérett fiúval találkozik, ugyanis 1 éves kor előtti szülés a bábik, a mama, vagy mindannyiuk életébe is kerülhet.

Bővebben a [Ha jön a gyerek](#) menüpontban.

### [Mennyi idő, míg a csincsilla bábik megszületnek?](#)

A terhesség 109 ? 120 napig tart, átlagosan 114 nap szokott lenni, azaz 3 hónap, 3 hét és 3 nap. Bővebben a [Ha jön a gyerek](#) menüpontban.

### [Ha megszülettek a kicsik, az apuka velük maradhat?](#)

A csincsilla apukák nagyon jó szülők, ezért nem kell elválasztani őket a családtól! Kivéve, ha bántja a bébit, vagy egymást tépik az anyával. Ennek a valószínűsége viszont nagyon kicsi.

Bővebben a [Ha jön a gyerek](#) menüpontban.

### [Kell szünet két szülés között?](#)

A szabály a következő. Mindig figyelj arra, hogy egymás után maximum 2 alkalommal szüljön a csincsilád! A második ellés után, kb. 1 hónap szünetet adj a mamának pihenésre!

### [Milyen legyen a terhes anyuka gondozása, és utógondozása?](#)

A kismamáknál a legfontosabb a sok vitamin, kalcium, hogy a kicsiknek erős legyen a csontozatuk, illetve némi óvatosság. Pl.: az utolsó hetekben ne legyen bent futó kerék stb. Szülés után pedig minimum 1 hétig nem kaphat a mama fürdőhomokot, nehogy összeszedjen valami fertőzést! Bővebben a [Ha jön a gyerek](#) menüpontban.

### [Mikor választhatom el a bébi csincsillát?](#)

A növendék csineszket 10-12 hetesen, legoptimálisabb 3 hónaposan lehet elválasztani a szülőktől. Ekkor kerülhetnek az új gazdihoz. Ekkora már többnyire száraz tápon élnek. Bővebben a [Ha jön a gyerek](#) menüpontban.

### [Tarthatom a csincsillámat más fajta állatokkal?](#)

Az biztos, hogy ha van a közelben csincsilla, akkor nem fog ráfanyalodni például egy nyuszira vagy degura. Hallottunk már olyanról, hogy egy degu-klánból kivertek egy kisfiú degut, és végül egy fiúcsincsillával osztotta meg ketrecét, a legnagyobb békességben. Persze ellenpélda is akad: egy pár csin és egy pár degu összeeresztve egyenlő kitépett szőrcomók?

Különböző fajtájú állatoknál nagyon fontos, hogy még kölyökkorban kerüljenek össze? azonos fajtájúaknál is jobb, könnyebb kölyköket összeszoktatni, mint felnőtteket, de különböző fajoknál ez még fokozottabban érvényes.

Természetesen a kutya, a macska, a görény, a piton vagy a varánusz nem megfelelő társ egy csininek, leginkább csak növényevő állatokkal próbálkozzatok?(nem, az elefánt sem megfelelő társ). Hasonló méretű és hasonló táplálkozási szokásokkal rendelkező társat keress a csinidnek!

Bővebben az [Egyedül nem megy](#) menüpontban.

### [Harapnak?](#)

Általában nem. Persze előfordul, hogy a bedugott ujjakat finom falatnak gondolja, de ha nem zargatják, böködik, ő sem bánt senkit.

### [Van szaguk?](#)

A szag általában nem okoz sok problémát. A csincsilla nagyon tiszta állat, elég lehet 2-3 hetente almot cserélni, attól függ, mit használunk alomnak. Amennyiben az alomnak már kezdjük erőteljesebben érezni a szagát, mindenképp ki kell cserélni.

### [Zajosak?](#)

Nappal alszanak, olyankor nem. Éjszaka azonban a csincsillák nagy zajt tudnak kelteni. Rázzák vagy rágják a rácst, rohangálnak a ketrecben. A csincsillakerék is hangos tud lenni.

### [Okos állat a csincsilla?](#)

Igen.:) A csincsilla pontosan tudja, hogy mit nem szabad csinálni, és azzal fog próbálkozni, ahányszor elfordítod róla a tekinteted. A csincsilla ketrecet mindenképp ajánlatos lakatta, vagy karabinerrel zárni, mert az egyszerű ?benyomás? zárú ketreceket nagyon hamar megtanulják



kinyitni.

Ennek ellenére a csincsillát nem lehet idomítani. Lehet, hogy megtanulja a nevét, de ez nagyon ritka.

### [Hagyhatom a csincsillámat kutyámmal vagy macskámmal játszani?](#)

Nem. A kutya és a macska is könnyen kárt tehet a csincsillában.

### [Szabad engedhetem a házban?](#)

A megfelelő óvintézkedésekkel felügyelet mellett egy bezárt szobában szabadon lehet engedni a csincsillánkat. Az egész házban nem ajánlatos, mert nem lehet megfogni. A csincsilla a nagyon kicsi résekbe is be tudja préselni magát, hiszen az állat minimum 7-e a bundája.

Óvintézkedések:

- A vezetékek biztonságossá tétele
- kedvenc könyveink eldugása
- konvektor, fűtőttest lezárása
- megközelíthetetlen rések betakarása

### [Szeretnek játékokkal játszani?](#)

Általában szeretnek. Jó játék lehet számukra egy papír zsebkendő, egy WC papír guriga. Általában nagyon szeretik a csincsillakereket is. Ennek az átmérője minimum 30 cm legyen, mert ennél kisebbbe a felnőtt példányok beszorulhatnak.

### [Milyen anyagok biztonságosak?](#)

Fafajták, amiket oda lehet nekik adni: (forgácsra is vonatkozik): Alma, Mandula, Fenyő, Barack, Cseresznye, Szilva

Fafajták, amiket nem szabad adni nekik: Cédrus (bár ez itt nem túl jellemző, de azért jó tudni, hogy mérgező), Citrom, Friss (!) fenyő (a sok illóolaj miatt)

A csincsilla mindent megrág. Beleértve ebbe a ruhákat, és akár az elektromos vezetékeket is. Ha megrágnak egy kis tiszta papírt, az sem árt nekik, de a nyomtatott anyagokkal vigyázzunk, nem lehet tudni, hogy nincs-e a nyomdafestékben az állatszámára ártalmas anyag.

Bővebben a [Fészekrakó](#) menüpontban.

### [Miért szalad el a csincsillám, amikor meg akarom fogni?](#)

A csincsilla nem macska, és nem szereti, ha fogdossák. Ezért inkább elrohan. Ha éppen kint van a ketrecéből, akkor sejti, hogy valószínűleg vissza akarod tenni, ő viszont nem akar visszamenni:) Üldözni semmiképpen nem érdemes egy idő után. Jobb leülni egy kicsit, és várni,

hátha odajön. Mindig csak akkora szobában tedd ki a csincsilládat, ahol meg is tudod fogni.

### [Hogyan hűtsem nyáron a csincsillát?](#)

A nyári hűtést többféleképpen is meg lehet oldani. Betehetsz nekik jégakkut. A jégakkut mindenképp valamilyen fém dobozba kell tenni, hogy a csincsilla ne férjen hozzá, és ne tudja szétrágni. Ha a jégakku felmelegedett, cserélni kell! Előfordulhat, hogy a jégakkus doboz a csini túl hidegnek találja. Ilyenkor akkor sem fog ráülni, ha az élete függ tőle. Ebben az esetben próbálkozz egy nagyobb járólappal. Hűtőben vagy hideg vízben hűtsd le, de ne jéghidegre, és tedd a csinek alá. Van, hogy csak az a célravezető módszer, ha a csint "erőszakkal" ráülteted, máskülönben lehet, hogy az idegen tárgyat messziről elkerülik.

A másik módszer, hogy elindítsz a szobában egy ventilátort, de ezt nem szabad közvetlenül a csincsillára irányítani, mert nagyon érzékenyek a huzatra.

Ha se jégakkud, se ventilátorod, akkor se add fel! Fogj egy nagy lepedőt, amit már nem használsz, mosd ki hideg vízben, jól csavard ki, és terítsd a ketrecre. 30-40 percig hűti a benti levegőt, utána cserélni kell.

Ha lepedőd sincs, megpróbálhatsz jégkockát adni a csinnek. Egyes csinik azonnal rárohannak, és elkezdik nyalogatni.

Próbálkozhatsz még befőtteszűvegnyi víz vagy jégkocka ketrecbe pakolásával is. A variációknak gyakorlatilag csak a képzelet szab határt.

De a legfontosabb:

**A csincsilla előtt nyáron mindig legyen friss tiszta víz!**

### [Honnan ismerem fel, ha hőgutát kapott, és mit tegyek ellene?](#)

A csincsillákat a hőség meg is ölheti! Ha a csincsilla elveszti az eszméletét, hideg helyre kell tenni, és valahogy csökkenteni a testhőmérsékletét. Ha magához tér adjunk neki néhány korty vizet. Várjuk meg, amíg teljesen magához nem tér, és csak utána tegyük vissza a ketrecébe, nehogy félig eszméletlenül leessen egy felsőbb szintről!

Bővebben az [Egészségére](#) menüpontban.

### [Mit tegyek, ha hasmenése van?](#)

Ha a kaki puha, kenhető és világos valószínűleg kevés szénát, sok nedves táplálékot kap, ez egy diétával könnyen helyrehozható. Egy darabig ne adj neki semmit csak szénát meg szárított kamillát, és sok vizet, nehogy a csincsilla kiszáradjon! Ha nem javul a helyzet 1-2 napon belül, mindenképp vidd orvoshoz. Ha híg, akkor már nagyobb baj van, ez esetben rögtön irány az állatorvos. Bővebben az [Egészségére](#) menüpontban.

### [Mit tegyek, ha váladékozik a szeme?](#)

Ha a csincsilla szeme váladékozik, óvatosan mosd le kamillás oldattal. Lehet, hogy csak a

szemébe ment valami. Ha nem múlik el a váladékozás pár órán belül, mindenképp vidd állatorvoshoz. Lehet, hogy megsérült a szeme, de az is előfordulhat, hogy be van gyulladva. Bővebben az [Egészségére](#) menüpontban.

### [Mennyi idő alatt és hogyan szoktathatok össze két csincsilát?](#)

Az idő 15 perc és akár két hónap között is mozoghat. Mindkettőre volt már példa.

Először: úgy kell a ketreceiket elhelyezni, hogy lássák egymást. Ne túl közel, mert eltűnhet egy-két ujjacska!

Futtatásnál, felügyelet mellett lehet figyelni a reakciókat, ha úgy néz ki, minden rendben, jön a következő lépés. Leendő (hatalmas) ketrecüket kettéosztani egy ráccsal, és a két fél-lakásba költöztetni őket. Így már valamennyire meg van osztva a terület, mert hogy a csinek területvédők, főleg a nőstények (a fiúk inkább a barátnőiket védik, mint a területüket:).

Eleinte a ketrec két végében alszanak majd, de egy-két héten belül összebújnak a rács két oldalán. Ilyenkor lehet kiszedni az elválasztó rácsot. Fontos, hogy legyen elég búvóhely, különben a vackon összeveszhetnek, etetőtál, itató és minden egyéb, tehát gyakorlatilag minden maradjon bent a ketrecben, ami a kettéosztott helyzetben bent volt.

Bővebben az [Egyedül nem megy](#) menüpontban.

### [Miért, mikor és milyen hangokat ad ki?](#)

A csincsilla ha egyedül van nagyon ritkán hallatja a hangját. Minimum 2 csin, vagy nagyon jó kapcsolat csinesz és gazdája között szükséges ahhoz, hogy rendszeresen beszéljessen?.

Bővebben az [Egyedül nem megy](#) menüpontban.

### [Hullik a csinem szőre, mit tegyek, mi az oka?](#)

Több lehetőség áll fent. A csined valamitől megijedt, és ledobta a bundájának egy részét. Ez esetben nem kell aggódnod, ez egy természetes reakció a csincsiláknál.

A másik lehetőség, hogy éppen vedlik. Nyárra a csininek is más bundája van, akárcsak a legtöbb állatnak.

A harmadik lehetőség, hogy a csini összeszedett valamilyen gombásfertőzést. Nézd meg a csini bőrét, ha ki van kipirulva, pikkelyes, akkor valószínűleg gombás. Ez esetben ajánlatos megmutatni egy állatorvosnak, aki majd megmondja, hogy mi a teendő.

### [Honnan tudom, hogy vemhes a nőstényem?](#)

Gyakran mondjuk, hogy érdemes rendszeresen, mondjuk 5-7 naponta lemérned csincsiláidat egy gramm pontos mérlegen. Mondjuk egy konyhai mérlegen. A vemhesség megállapításánál is ez a legjobb házi módszer. Ha vezetted a súlyát, észre fogod venni a gyarapodást is.

Egy egészséges felnőtt csincsilla súlya nemigen változik. A vemhes nőstények eleinte havi 30-50 grammot szednek fel, később - pláne ha nagy az alom, azaz több bébit vár - akár hetente

híznak ennyit. Egy babával kb. 80-120 grammot híznak összesen. A bébi súlya 35-60 gramm, plusz magzatvíz, plusz némi hízás. Ha nagyon muszáj tippelni, akkor babánként sacca száz grammal lehet számolni.

Például: ha 300 gramm körül hízik, szinte biztos, hogy három gyerek lesz, mert a hármas almokban már kisebbek a csemeték.